

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(CÔTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAÔNE, JURA, SAÔNE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.

C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Bulletin n° 43 - AVRIL 1964

2 AVRIL 1964

VIGNE

ACARIOSE : Provoqués par un minuscule acarien, les dégâts, désignés sous le nom d'acariose, sont bien connus des vignerons. Lors de printemps froids, ils peuvent être confondus avec l'action des basses températures. Les pousses attaquées végètent et présentent des feuilles petites, frisées, généralement duveteuses.

Plusieurs méthodes de lutte peuvent être envisagées, variables quant au choix des produits et quant à la date d'application.

A - Traitement : . . . - avant débourrement :

- à base d'huiles d'anthracène jaunes (mélange d'huiles d'anthracène et de colorant nitré), à la dose de 3 % (3 Kgs par hectolitre d'eau). Il convient de bien "lessiver" les ceps.

- à base de bouillie sulfocalcique à 6 % ou bien de polysulfure de baryum (. 5 Kgs).

- à base d'oléoparathion à la dose de 2 %.

B - Au moment du débourrement :

En utilisant le Phenkapton, à raison de 20 grammes de matière active par hectolitre d'eau (soit 0 Kg 100 de produit commercial).

C - Enfin, après débourrement, en utilisant des produits acaricides que nous précisons à ce moment-là dans notre note d'informations.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POIRIER & DU POMMIER : Les premières périthèces sont arrivés à maturité. Des projections peuvent dès lors se produire. Nous conseillons d'effectuer un traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C 3.

OIDIUM DU POMMIER : La lutte contre cette maladie doit être entreprise très tôt. Les premiers traitements semblent prépondérants pour assurer une protection satisfaisante. Le moment est donc venu d'intervenir. Les traitements dirigés contre ce champignon doivent toujours être copieux. Aussi n'est-il pas toujours conseillé d'effectuer un traitement mixte Tavelure - Oïdium, le traitement tavelure pouvant être réalisé avec un débit réduit.

.../...

DLP 4-4-64 294000

p50

MONILIA DES ARBRES A NOYAUX : Les arboriculteurs qui n'ont pas effectué le traitement indiqué dans notre note du 3 Mars devraient l'envisager actuellement. Pour ceux qui l'ont appliqué, le renouvellement est conseillé.

PUCERONS : Les premiers adultes (pucerons verts du pommier) sont constatés dans certaines situations. Dans ce cas, ajouter à la bouillie fongicide un aphicide, de préférence non systémique.

TEIGNE DU CERISIER : (Zone de production de cerises à kirsch de FOUGEROLLES - Haute-Saône) :

Dans les vergers habituellement attaqués par ce ravageur, si aucun traitement de pré-débourrement (colorants nitrés ou cléoparathion) n'a encore été effectué, il est recommandé d'appliquer dès que possible un Oléoparathion à la dose de 30 grammes de Parathion/Hectolitre au minimum.

COLZA

Les captures de C. napi ont été abondantes jusqu'au 23 ; la montaison étant à peine amorcée, il serait encore possible d'intervenir et il est recommandé de le faire si aucun traitement n'a été effectué jusqu'alors.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.